

# Ontworming hond & kat: Hoe als apotheker uw klant bijstaan met deskundig advies?



## Waarom ontwormen?



**Bescherming mens:** Verschillende wormen kunnen overgedragen worden van dier op mens zoals de spoelworm en de lintworm. Vooral kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met verminderde afweer lopen gevaar.



**Bescherming dier:** Bij jonge en verzwakte dieren kan een wormbesmetting grote schade aanrichten in vitale organen en zorgen voor lichamelijke klachten (oa. braken, diarree, obstructie, gewichtsverlies, slechte vacht), interferentie immuniteit en zelfs sterfte.



**Infectiedruk omgeving verlagen:** Besmette honden en katten vertonen niet altijd symptomen, maar scheiden wel onzichtbare wormeieren uit in de omgeving! Een besmet milieu vormt een infectiegevaar voor andere dieren en mensen.

## Hoe een wormbesmetting voorkomen?



**Goede hygiëne:** Handen wassen na tuinieren/spelen in zandbak - Groenten en fruit wassen - Uitwerpselen in de tuin steeds opruimen - Regelmatig reinigen van de kattenbak - Contact vermijden met loslopende honden, katten en vossen - Geen rauw vlees of slachtafval geven aan honden en katten.



**Ontworming:** Regelmatige ontworming van hond en kat is noodzakelijk om de gezondheid van dier en mens te garanderen en de infectiedruk in de omgeving laag te houden.



**Vlo preventie:** De vlo is tussengastheer voor de lintworm. Regelmatig gebruik van een anti-vlo middel vermindert risico op besmetting met een lintworm. Omgekeerd: Is het dier besmet met vlooiën? Geef dan steeds een ontwormingsmiddel werkzaam tegen lintwormen mee!

## Welk ontwormingsmiddel gebruiken?

### Drontal®

- ✓ Werkzaam tegen alle relevante rond-en lintwormen
- ✓ Slechts 1 enkele toediening
- ✓ Zeer smakelijke tablet (volwassen dier) of suspensie (pups)
- ✓ Veilig voor hondenrassen met een MDRI(-/-) mutatie, tijdens het laatste derde van de dracht en tijdens de lactatie



2 tabletten  
1 tab/4 kg  
CNK 1255058



1 ml/kg  
lichaamsgewicht  
Pups ouder dan  
2 weken en  
zwaarder dan 0,6kg  
CNK 2656783



2 of 6 tabletten  
1 tab/10 kg  
Vanaf 2 kg  
CNK 3245693  
CNK 3245701



2 tabletten  
1 tab/35 kg  
Vanaf 7 kg  
CNK 3690302

Lichaams- gewicht	Aantal tabletten
2-5	½
> 5 - 10	1
> 10 - 15	1½
> 15 - 20	2

Lichaams- gewicht	Aantal tabletten
7 - 17,5	½
> 17,5 - 35	1
> 35 - 52,5	1½
> 52,5 - 70	2

### Dronspot®

- ✓ Werkzaam tegen alle relevante rond-en lintwormen
- ✓ Slechts 1 enkele toediening
- ✓ Zeer makkelijke SPOT-ON pipet toediening
- ✓ Ook werking tegen de wormlarven: Zeer volledige ontworming voor buitenkatten!
- ✓ Mag gebruikt worden bij drachtige/lacterende dieren



**Kleine katten**  
≥ 0,5 kg - 2,5 kg  
0,35 ml in 1 pipet  
CNK 4131850



**Middelgrote katten**  
≥ 2,5 kg - 5 kg  
0,7 ml in 1 pipet  
CNK 4131843



**Grote katten**  
≥ 5 kg - 8 kg  
1,12 ml in 1 pipet  
CNK 4131835

\* voor katten > 8 kg:  
gebruik een geschikte  
combinatie van pipetten

# Wanneer ontwormen?

Leeftijd puppy	Ontworming	Puppy	Moederdier <sup>1</sup>
2 weken	1e keer	<b>Drontal®</b> PUP Vanaf 2 weken en vanaf 0,6 kg	<b>Drontal®</b> DOG
4 weken	2e keer		
6 weken	3e keer		
8 weken <sup>2</sup>	4e keer		
Tot 6 maanden	Maandelijks	<b>Drontal®</b> DOG	<b>Drontal®</b> DOG
Ouder dan 6 maanden	Minstens 4 keer per jaar <sup>3</sup>	Vanaf 2 kg	



Een ontwormingsmiddel heeft een kortdurende werking. Voor elke herbesmetting is een nieuwe behandeling noodzakelijk!

<sup>1</sup> Zogende teven steeds tegelijk met de pups ontwormen

<sup>2</sup> Tot 2 weken na het spenen

<sup>3</sup> 4 keer per jaar behandelen of ontlastingsonderzoek verrichten van zodra een hond buiten komt en in contact komt met soortgenoten, zandbakken of speelweides

Wormbestrijding bij hond en kat. ESCCAP Richtlijn 01 Zesde Druk – April 2020. Online te raadplegen op: [https://www.escap.eu/uploads/docs/dvd51092\\_ESCCAP\\_Endo\\_Richtlijn\\_1\\_6e\\_dr\\_NL\\_1p.pdf](https://www.escap.eu/uploads/docs/dvd51092_ESCCAP_Endo_Richtlijn_1_6e_dr_NL_1p.pdf).



Leeftijd kitten	Ontworming	Kitten	Moederdier <sup>1</sup>
3 weken	1e keer	<b>Drontal®</b> CAT Vanaf 3 weken	<b>Dronspot®</b>
5 weken	2e keer		
7 weken	3e keer		
9 weken	4e keer	<b>Dronspot®</b> Vanaf 8 weken en 0,5 kg	<b>Dronspot®</b>
11 weken <sup>2</sup>	5e keer		
Tot 6 maanden	Maandelijks		
Ouder dan 6 maanden	Minstens 4 keer per jaar <sup>3</sup>		

<sup>1</sup> Zogende kattinnen steeds tegelijk met de kittens ontwormen

<sup>2</sup> Tot 2 weken na het spenen

<sup>3</sup> 4 keer per jaar behandelen of ontlastingsonderzoek verrichten van zodra een kat buiten komt en in contact komt met soortgenoten, zandbakken of speelweides

Wormbestrijding bij hond en kat. ESCCAP Richtlijn 01 Zesde Druk – April 2020. Online te raadplegen op: [https://www.escap.eu/uploads/docs/dvd51092\\_ESCCAP\\_Endo\\_Richtlijn\\_1\\_6e\\_dr\\_NL\\_1p.pdf](https://www.escap.eu/uploads/docs/dvd51092_ESCCAP_Endo_Richtlijn_1_6e_dr_NL_1p.pdf).

**DRONTAL CAT**, (pyrantelebonaat + praziquantel) omhulde tabletten voor katten. **Indicaties:** Voor de behandeling van mengbesmettingen met rondwormen en lintwormen bij katten, veroorzaakt door: *Toxocara cati* (syn. *mystax*), *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Dipylidium caninum*, *Hydatigera (Taenia) taeniaeformis*, *Echinococcus multilocularis*. Aangezien lintwormbesmettingen niet vóór de derde levensweek optreden bij de kat, is de behandeling met DRONTAL CAT niet geïndiceerd tot deze leeftijd. **Dosering:** 1 tablet per 4 kg (CAT) lichaamsgewicht. **Contra-indicaties:** Geen bekend. **Bijwerkingen:** Milde en voorbijgaande maagdarfstoornissen zoals speekselen, braken en/of diarree en milde en voorbijgaande neurologische stoornissen zoals ataxie kunnen in zeer zeldzame gevallen voorkomen.

**Drontal** (febantel/ pyrantelebonaat/ praziquantel) **Dog Tasty** 150/144/50 mg en **Large Dog Tasty** 525/504/175 mg tabletten voor honden. **Indicaties:** Behandeling van gemengde infecties door nematoden en cestoden van de volgende species: Spoelwormen (volwassen en late immature vormen): *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*; Haakwormen (volwassenen): *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*; Zweepwormen (volwassenen): *Trichuris vulpis*; Lintwormen (volwassen en late immature vormen): *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp., *Mesocestoides* spp.. Om infecties door de protozoa *Giardia* spp. bij pups en volwassen honden onder controle te helpen houden. **Dosering:** 1 tablet per 10 kg (Dog) of 35 kg (Large Dog) lichaamsgewicht. **Contra-indicaties:** Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen. Niet gebruiken tijdens de 1ste en 2e derden van de dracht. **Bijwerkingen:** In zeer zeldzame gevallen kunnen lichte en voorbijgaande stoornissen optreden aan het spijsverteringskanaal, zoals braken en/of diarree. Dog: In individuele gevallen kunnen deze tekenen gepaard gaan met niet-specifieke tekenen zoals lusteloosheid, anorexie of hyperactiviteit.

**DRONTAL PUP**, (14,40 mg/ml pyrantelebonaat + 15 mg/ml febantel), suspensie voor oraal gebruik voor honden. **Indicaties:** Rondwormmiddel voor gebruik bij pups en jonge honden. Ter behandeling van besmettingen met de volgende rondwormen: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*. **Dosering:** 1 ml Drontal Pup per 1 kg lichaamsgewicht. **Contra-indicaties:** Geen. **Bijwerkingen:** In zeer zeldzame gevallen kunnen lichte, voorbijgaande maagdarfstoornissen (bv. braken, diarree) optreden.

**Dronspot Spot-on** (Praziquantel/Emodepside) **oplossing voor kleine katten** (30 mg/7,5 mg), **oplossing voor middelgrote katten** (60 mg/15 mg), **oplossing voor grote katten** (96 mg/24 mg). **Indicaties:** Voor de behandeling van gemengde parasitaire infecties bij katten veroorzaakt door rondwormen en lintwormen van de volgende species: *Toxocara cati* (onvolgroeide en volwassen stadia, L4 en L3), *Toxocara canis* (L3 larven – behandeling van poezen tijdens late dracht om besmetting van de jongen via de melk te voorkomen), *Toxascaris leonina* (onvolgroeide en volwassen stadia en L4), *Ancylostoma tubaeforme* (onvolgroeide en volwassen stadia en L4), *Dipylidium caninum* (onvolgroeide en volwassen stadia), *Taenia taeniaeformis* (volwassen stadia), *Echinococcus multilocularis* (volwassen stadia). **Dosering:** De aanbevolen minimale dosis is 3 mg/kg lichaamsgewicht emodepside en 12 mg/kg lichaamsgewicht praziquantel, overeenkomend met 0,14 ml Dronspot/kg lichaamsgewicht. Voor de behandeling van rondwormen en lintwormen is een eenmalige toediening per behandeling doeltreffend. Voor de behandeling van katten als preventie van besmetting met *Toxocara cati* (L3 larven) door de melk aan de jongen, is een eenmalige toediening per behandeling ongeveer zeven dagen vóór de verwachte worp doeltreffend. **Contra-indicaties:** Niet gebruiken bij kittens jonger dan 8 weken of van minder dan 0,5 kg. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen. **Bijwerkingen:** In zeer zeldzame gevallen kunnen speekselen en braken optreden. Milde en voorbijgaande neurologische aandoeningen zoals ataxie of tremor kunnen voorkomen in zeer zeldzame gevallen. Deze effecten zijn verondersteld te treden ten gevolge van het likken door de kat aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. In zeer zeldzame gevallen werd na toediening van het diergeneesmiddel voorbijgaande alopecie, jeuk en/of ontsteking ter hoogte van de toedieningsplaats waargenomen. **Aflevering:** VRIJ - REG NL 123462-123463-123464. **Registratiehouder:** Vetoquinol S.A. **Verdere informatie op aanvraag beschikbaar** via [info.be@vetoquinol.com](mailto:info.be@vetoquinol.com)